


L'albicocco può crescere con le giuste varietà



Per la diffusione della **superficie coltivata ad albicocco** sono necessarie innovazioni varietali che soddisfino al meglio le esigenze del consumatore e del produttore. Un calendario ampio e una gamma di offerta variegata possono consentire il salto di qualità a una specie relegata sempre all'ombra del pesco.

L'**adattabilità ambientale** è stato da sempre uno dei punti deboli dell'albicocco soprattutto al sud, dipendente soprattutto dal fabbisogno in freddo e caldo di ciascuna varietà, che se basso o mal distribuito può comportare un deficit

complessivo, con risvolti negativi sulle rese.

In pratica serve lo “sviluppo” di una varietà per delineare un profilo corredato di tutte quelle **specifiche, pomologiche, agronomiche, fitosanitarie**, ecc. in modo da individuare gli areali ad esse più adatti, ed eventualmente i canali commerciali e le tipologie di filiera verso cui poterle dedicare. Dobbiamo, infine, produrre varietà che producano frutti con buone caratteristiche organolettiche, e con colore completamente rosso del frutto, aspetti molto apprezzati dai consumatori. Con tutti questi caratteri/variabili da tenere in considerazione è chiaro che il lavoro di miglioramento genetico risulta più difficile e impegnativo, in quanto occorre aggiungere altri caratteri a quelli già acquisiti al fine di permettere la coltivazione in aree più o meno estese. Caratteri biologici come l'autofertilità, possibilmente coniugata a **fioritura medio-tardiva e abbondante**, una rusticità globale, e la **resistenza/tolleranza a Sharka** debbono essere considerati quando si selezionano e diffondono nuove varietà.

Scelta varietale

valutazi
osserva
importa
specific

Come s
ormai le
produzi
l'epoca
principa
fabbiso

La prim
ma dal
meridio
fioritura
segnala
raccolta

In ques
maturaz
del mer
data la
produtti
avere c
necessi
introdot



Mikado*

La
o numero di anni di
per cui ogni anno è
i quella varietà nel territorio

o della raccolta al sud sono
clo colturale. Per le
, con il tentativo di anticipare
ntando diverse varietà,
atterizzate da medio-basso

ante per aspetto e pezzatura,
*, che ha trovato nel
ato fabbisogno in freddo e la
e di media pezzatura; si
nda di non effettuare una
ia è spiccata.

ebas-Csic di Murcia, a
nza in linea con le richieste
, aspetto non da trascurare
tori. Dopo le delusioni
ti prospettive si possono
sapore e sovraccolore, che
anni da cui sono state

Nel per
per la c
ha dato
bell'asp
per l'ep
pre-rac
opportu

Tsunar
frutti, pa
spaccat

Una var
porta il

Tratto d
L'albic
di C. Me
L'articol



Mogador*

adattabilità a diversi ambienti,
erò non in tutte le condizioni
tosterilità; i frutti di
mette una ottimale gestione
noccioli spaccati e la cascola
ata, deve essere
-raccolta.

eristiche organolettiche dei
i frutti non elevata e la

ubista, che per la prima volta
presenta buona produttività.

o n. 23/2021

ne su Rivista Digitale