

Cimice asiatica su soia, attenzione alta anche per il 2020



Negli areali tradizionalmente vocati alla soia continua l'espansione della cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), **anche se sembra essersi ridotta proprio nelle aree dove, nel 2017, si erano visti i danni più consistenti**, cioè nei comuni di Sedegliano e Codroipo, in provincia di Udine.

La manifestazione classica della sua presenza nella soia, e cioè la **presenza di fusti e foglie che rimangono verdi nelle piante ai bordi degli appezzamenti**, è stata assai meno evidente rispetto agli anni precedenti, limitandosi alle aree

prossime alle alberature.

È possibile che **i nemici naturali, dove presenti, stiano facendo il loro lavoro**, ma va comunque mantenuta la giusta attenzione su questo insetto prima di poter considerare superato il problema.

Sarà interessante verificare l'evoluzione nelle aree dove la colonizzazione della cimice è più recente e il numero di catture è ancora elevato.

Tratto dall'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 9/2020

Soia, le varietà consigliate per le semine 2020

di M. Signor, S. Spolon, M. Lottari, E. Visentin

L'articolo completo è disponibile per gli abbonati anche su Rivista Digitale