

Vitelli, suggerimenti per ridurre l'incidenza della diarrea



L'**insorgere della diarrea nei vitelli** ha ripercussioni su tutta la carriera produttiva dell'animale, dal ritardo della 1^a fecondazione alla riduzione della produzione di latte. Per questo in allevamento la diarrea **deve diventare un evento raro** senza mai, peraltro, rivestire un interesse marginale. Come fare?

Ecco alcuni **suggerimenti** utili per raggiungere questo importante obiettivo:

- garantire un'**abbondante, pulita e asciutta lettiera** nel box parto;
- **disinfettare l'ombelico** del vitello;

- non lasciare che il vitello assuma il **colostro** direttamente dalla madre;
- **stabulare singolarmente** i vitelli in igloo o gabbietta;
- valutare il contenuto di **immunoglobuline**;
- somministrare **2-3 litri di colostro**;
- monitorare l'efficacia del trasferimento dell'**immunità passiva**;
- perseguire un elevato standard di **pulizia delle strutture stabulative**.

Tratto dall'articolo pubblicato sul supplemento *Stalle da Latte a L'Informatore Agrario* n. 4/2020

Vitelli, suggerimenti per ridurre l'incidenza della diarrea

di M. Olivari, D. Fayer

L'articolo completo è disponibile per gli abbonati anche su Rivista Digitale